ГРУППА 10

51 вопрос

Категории АВС · теоретические вопросы

1. **При оказании помощи пострадавшему с травмой головы необходимо:**

1. Уложить его, приподняв ноги.
2. **Уложить его, приподняв голову и туловище, обеспечив полусидячее положение.**
3. Уложить его в горизонтальное положение.

Ответ: 2

---

2. **Кому из следующих пострадавших при дорожно-транспортном происшествии Вы окажете помощь в первую очередь?**

1. Испуганной беременной женщине.
2. Ребёнку с ссадинами.
3. Мужчине с переломом плеча.
4. **Мужчине, находящемуся без сознания.**

Ответ: 4

---

3. **При оказании помощи пострадавшему с носовым кровотечением необходимо:**

1. Запрокинуть голову пострадавшего назад.
2. **Наклонить голову пострадавшего вперёд и сжать верхнюю часть носа.**
3. Ввести в нос пострадавшего ватный тампон.
4. Дать крови вытечь и дождаться самостоятельной остановки кровотечения.

Ответ: 2

---

4. **Во время управления автомобилем водитель внезапно начинает жаловаться на сильную сжимающую боль в груди и затруднённое дыхание. Что следует сделать?**

1. Предложить ему самостоятельно направиться в ближайшую больницу.
2. Дать стакан воды и две таблетки валерианы.
3. **Немедленно остановить автомобиль и включить аварийную световую сигнализацию.**
4. Посоветовать ему немного пройтись и подышать свежим воздухом.

Ответ: 3

---

5. **Какую помощь следует оказать пострадавшему при судорожном приступе?**

1. Удерживать пострадавшего, пытаясь подавить судороги.
2. Попытаться открыть рот, удерживать язык и поместить какой-либо предмет между зубами.
3. Попытаться освободить дыхательные пути, запрокинув голову пострадавшего.
4. **Не удерживать пострадавшего и дождаться окончания судорог.**

Ответ: 4

---

6. **Что следует сделать при оказании помощи при ожоге?**

1. Оставить ожог открытым.
2. Вскрыть наполненные жидкостью пузыри, затем наложить тугую повязку.
3. Нанести на ожог масло.
4. **Охладить ожог водой, затем закрыть стерильным перевязочным материалом или чистой тканью.**

Ответ: 4

---

7. **В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход упал и повредил руку. На предплечье имеется большая рана длиной около 5 см, из которой непрерывно вытекает тёмная кровь. Что следует сделать для остановки кровотечения?**

1. Промыть рану водой.
2. **Поднять руку пострадавшего и наложить давящую повязку.**
3. Обработать рану спиртовым раствором йода.

Ответ: 2

---

8. **При закрытых повреждениях мягких тканей конечностей в первые часы необходимо:**

1. Наложить на повреждённое место согревающий компресс.
2. **Приложить холод к повреждённому месту и приподнять конечность.**
3. Приложить холод к повреждённому месту и держать конечность ниже уровня сердца.
4. Наложить на повреждённое место спиртовой компресс.

Ответ: 2

---

9. **Водитель длительное время менял колесо автомобиля, находясь на корточках. Резко встав, он схватился за голову, внезапно потерял сознание и упал. Что следует сделать?**

1. Попытаться посадить его.
2. **Приподнять его ноги.**
3. Облить лицо холодной водой.
4. Похлопать по лицу.

Ответ: 2

---

10. **Что следует сделать, если невозможно обеспечить безопасность места происшествия?**

1. Оказывать помощь всем, соблюдая осторожность.
2. Оказать помощь пострадавшему, находящемуся ближе всего.
3. **Не приближаться, немедленно вызвать экстренные службы и не допускать посторонних к месту происшествия.**
4. Не приближаться и попросить другого человека оказать помощь.

Ответ: 3

---

11. **Вы видите лежащего человека и замечаете выступающую из голени кость и кровь. Если место происшествия безопасно, что следует сделать в первую очередь?**

1. Вызвать скорую медицинскую помощь.
2. **Проверить сознание и дыхание.**
3. Обездвижить ногу.

Ответ: 2

---

12. **При открытом переломе конечности при оказании помощи необходимо:**

1. Немедленно приподнять повреждённую конечность.
2. **Закрыть рану стерильной салфеткой и обездвижить повреждённую конечность.**
3. Остановить кровотечение прямым давлением.
4. Приложить холод к ране.

Ответ: 2

---

13. **При травме грудной клетки следует:**

1. Уложить пострадавшего в горизонтальном положении.
2. **Посадить, прислонив на травмированную сторону.**
3. Посадить, прислонив на здоровую сторону.

Ответ: 2

---

14. **При выпадении органов из открытой раны живота следует:**

1. Промыть выпавшие органы и осторожно попытаться вправить их.
2. **Накрыть выпавшие органы чистой влажной тканью и полиэтиленовой плёнкой.**
3. Отсечь выпавшие органы и перевязать рану.
4. Не прикасаться к ним и в таком состоянии доставить пострадавшего в больницу.

Ответ: 2

---

15. **Пострадавшего, находящегося без сознания, но имеющего дыхание, следует:**

1. Уложить на спину.
2. Открыть рот и вытянуть язык.
3. **Повернуть на бок и запрокинуть голову.**

Ответ: 3

---

16. **При сильном кровотечении следует:**

1. Только закрыть рану повязкой.
2. **Наложить давящую повязку на повреждённую область и прижать артерию в точке её пальцевого прижатия.**
3. Засыпать рану золой.

Ответ: 2

---

17. **При дорожно-транспортном происшествии в первую очередь следует:**

1. Придать пострадавшему удобное положение.
2. **Осмотреть место происшествия и обеспечить безопасность.**
3. Проверить наличие у пострадавшего сильного кровотечения.
4. Извлечь пострадавшего из автомобиля.

Ответ: 2

---

18. **Если в ране пострадавшего находится инородное тело, при оказании помощи следует:**

1. Удалить инородное тело из раны.
2. Дать повреждённому участку кровоточить.
3. **Обеспечить неподвижность инородного тела.**
4. Обработать область раны спиртом.

Ответ: 3

---

19. **Пульс взрослого человека в состоянии покоя составляет:**

1. 40–60 ударов в минуту.
2. **60–80 ударов в минуту.**
3. 80–100 ударов в минуту.

Ответ: 2

---

20. **Частота дыхания взрослого человека в состоянии покоя составляет:**

1. **12–18 дыхательных движений в минуту.**
2. 20–30 дыхательных движений в минуту.
3. 40–60 дыхательных движений в минуту.

Ответ: 1

---

21. **При дорожно-транспортном происшествии пострадавшего следует извлечь из автомобиля, если:**

1. У пострадавшего имеются серьёзные травмы.
2. **Место происшествия опасно, например существует угроза взрыва.**
3. На автомобиль упал электрический провод.

Ответ: 2

---

22. **При подозрении на внутреннее кровотечение в брюшной полости при оказании помощи следует:**

1. **Уложить пострадавшего и приложить холод к повреждённой области.**
2. Приложить к животу горячую грелку.
3. Наложить на живот давящую повязку.
4. Дать пострадавшему большое количество жидкости.

Ответ: 1

---

23. **Вы слышите звук работающего двигателя из гаража соседа и, открыв дверь, видите соседа, лежащего на полу. Что следует сделать в первую очередь?**

1. **Широко открыть двери и выключить двигатель, а при возможности вынести пострадавшего из опасной зоны.**
2. Тщательно осмотреть тело пострадавшего для выявления повреждений.
3. Перевести пострадавшего в устойчивое боковое положение.
4. Помочь пострадавшему принять полусидячее положение.

Ответ: 1

---

24. **После обнаружения пострадавшего без сознания в первую очередь следует:**

1. Дать ему холодной воды.
2. Повернуть его на бок, придав устойчивое положение.
3. Поддерживать нормальную температуру тела.
4. **Открыть дыхательные пути и проверить наличие дыхания.**

Ответ: 4

---

25. **Для проверки кровообращения в конечности Вы нажимаете на ноготь повреждённой конечности ниже повязки и отпускаете его. Кровообращение в конечности нарушено, если:**

1. Пострадавший ощущает боль.
2. Пострадавший ощущает дискомфорт.
3. При надавливании ноготь с трудом бледнеет.
4. **После отпускания ноготь с трудом вновь приобретает розовый цвет.**

Ответ: 4

---

26. **Ваш друг, страдающий сахарным диабетом, чувствует себя плохо и не помнит, когда в последний раз вводил инсулин. Что следует сделать в первую очередь?**

1. **Дать ему сахар или сладкую жидкость.**
2. Предложить ему отдохнуть несколько часов.
3. Посоветовать ввести инсулин.

Ответ: 1

---

27. **Кровотечение наиболее опасно, если:**

1. Кровь свёртывается в течение 10 минут.
2. **Кровь бьёт из раны струёй.**
3. Кровь имеет тёмно-красный цвет.
4. Кровь непрерывно вытекает из раны.

Ответ: 2

---

28. **Автомобиль столкнулся со столбом, и электрический провод упал на пострадавшего, лежащего без сознания рядом с автомобилем. При оказании помощи в первую очередь следует:**

1. Оттащить пострадавшего от источника электрического тока.
2. Провести первичный осмотр.
3. **Удалить провод с пострадавшего с помощью изолирующего предмета.**
4. Найти на теле места входа и выхода электрического тока — ожоги.

Ответ: 3

---

29. **Для защиты от заражения при оказании первой помощи следует:**

1. **Избегать непосредственного контакта с раной и оказывать помощь только в стерильных перчатках.**
2. Не оказывать помощь пострадавшим с кровотечением.

Ответ: 1

---

30. **При приступе бронхиальной астмы пострадавшему следует:**

1. **Помочь принять полусидячее положение.**
2. Уложить и приподнять ноги.
3. Уложить с согнутыми коленями.
4. Уложить с приподнятой головой.

Ответ: 1

---

31. **Пострадавшего с травмой живота следует:**

1. Уложить с приподнятой головой.
2. Уложить и приподнять ноги.
3. **Уложить с согнутыми коленями.**

Ответ: 3

---

32. **При обмороке пострадавшего следует:**

1. Помочь принять полусидячее положение.
2. **Уложить и приподнять ноги.**
3. Уложить с согнутыми коленями.
4. Уложить с приподнятой головой.

Ответ: 2

---

33. **При столкновении автомобиля с низким кузовом со взрослым пешеходом ростом 1 м 55 см и выше наиболее вероятно возникновение повреждений:**

1. **В области нижних конечностей и головы.**
2. В области таза и грудной клетки.

Ответ: 1

---

34. **При столкновении автомобиля с низким кузовом с ребёнком в возрасте 3–5 лет наиболее вероятно возникновение повреждений:**

1. В области нижних конечностей и головы.
2. **В области таза и грудной клетки.**

Ответ: 2

---

35. **Если электрический провод упал на автомобиль, следует:**

1. Помочь находящимся в автомобиле лицам немедленно покинуть его.
2. **Попросить находящихся в автомобиле лиц оставаться внутри до отключения электрического тока.**

Ответ: 2

---

36. **При обработке неопасных ран следует:**

1. **Промыть рану водой с мылом, затем наложить повязку.**
2. Обработать рану спиртосодержащими средствами — йодом, водкой, одеколоном и т. п.

Ответ: 1

---

37. **При обработке опасных ран следует:**

1. Промыть рану водой с мылом.
2. Обработать рану спиртосодержащими средствами — йодом, водкой, одеколоном и т. п.
3. **Остановить кровотечение и наложить повязку.**

Ответ: 3

---

38. **Какую информацию необходимо сообщить оператору при вызове скорой медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия?**

1. Указать ближайший ориентир к месту происшествия. Сообщить количество пострадавших, их пол и возраст.
2. Указать ближайшую к месту происшествия улицу и номер дома. Сообщить, кто пострадал в результате происшествия (пешеход, водитель или пассажир транспортного средства), и описать полученные травмы.
3. **Указать место происшествия (улицу, номер дома и ближайшие ориентиры). Сообщить количество пострадавших, их пол, примерный возраст, наличие сознания, дыхания и кровообращения, а также сильного кровотечения, переломов и иных травм. Ожидать, пока оператор не подтвердит принятие вызова.**

Ответ: 3

---

39. **Какое оптимальное положение следует обеспечить пострадавшему, находящемуся в сознании, при подозрении на повреждение позвоночника?**

1. Уложить пострадавшего на бок.
2. **Уложить пострадавшего на спину на твёрдую ровную поверхность, без необходимости не перемещать и не изменять его положение.**
3. Уложить пострадавшего на спину, подложить под шею валик из одежды и поднять ноги.

Ответ: 2

---

40. **Как следует оказывать первую помощь при обморожении и переохлаждении?**

1. Растереть поражённые участки тела снегом или шерстяной тканью, затем согреть, дать алкогольный напиток и перенести пострадавшего в тёплое помещение.
2. **Согреть и обездвижить поражённые участки тела, укрыть пострадавшего тёплой одеждой или одеялом, дать тёплое питьё и перенести в тёплое помещение.**
3. Смазать поражённые участки тела мазью, наложить согревающий компресс и грелку, перенести пострадавшего в тёплое помещение и дать тёплое питьё.

Ответ: 2

---

41. **Какую первую помощь следует оказать при черепно-мозговой травме с наличием раны волосистой части головы?**

1. **Остановить кровотечение прямым давлением на рану и наложить давящую повязку. При потере сознания придать пострадавшему устойчивое боковое положение. По возможности приложить холод к области повреждения головы.**
2. Обездвижить шейный отдел позвоночника с помощью импровизированной шины (воротника). Наложить на рану стерильный ватный тампон, уложить пострадавшего на спину с приподнятыми ногами. По возможности приложить холод к голове.
3. Наложение шейной шины запрещается. Необходимо закрыть рану медицинским лейкопластырем и уложить пострадавшего на бок.

Ответ: 1

---

42. **В каком положении следует уложить пострадавшего без сознания при наличии кровообращения и дыхания?**

1. На спину, подложив валик под голову.
2. На спину с разведёнными ногами.
3. **Придать пострадавшему устойчивое боковое положение так, чтобы согнутое колено касалось земли, а верхняя рука находилась под щекой.**

Ответ: 3

---

43. **Как долго может оставаться наложенным кровоостанавливающий жгут?**

1. В тёплое время — не более получаса, в холодное время — не более одного часа.
2. **В тёплое время — не более одного часа, в холодное время — не более получаса.**
3. Время наложения жгута не ограничено.

Ответ: 2

---

44. **Как определить наличие дыхания у пострадавшего без сознания?**

1. Взять пострадавшего за подбородок, запрокинуть голову и в течение 10 секунд наблюдать за движением грудной клетки.
2. **Положить одну руку на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой руки поднять подбородок и запрокинуть голову; в течение 10 секунд наблюдать за дыханием, стараясь ощутить выдыхаемый воздух щекой и следить за движением грудной клетки.**
3. Не запрокидывая голову пострадавшего, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд наблюдать за дыханием, стараясь ощутить выдыхаемый воздух щекой и следить за движением грудной клетки.

Ответ: 2

---

45. **Каковы основные признаки сильного артериального кровотечения и с какого действия следует начать оказание первой помощи?**

1. Из раны медленно вытекает кровь тёмного цвета. На рану накладывается давящая повязка с указанием времени её наложения.
2. **Из раны ярко-алая кровь вытекает сильной прерывистой струёй или фонтаном. Повреждённую артерию следует прижать пальцами, затем выше раны, как можно ближе к ней, наложить кровоостанавливающий жгут с указанием времени его наложения.**
3. Кровь медленно вытекает из раны. Ниже места повреждения накладывается кровоостанавливающий жгут с указанием времени его наложения.

Ответ: 2

---

46. **Разрешается ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании первой помощи?**

1. Разрешается.
2. Разрешается в случае крайней необходимости.
3. **Запрещается.**

Ответ: 3

---

47. **Как остановить кровотечение при повреждении вен и небольших артерий?**

1. **Наложить давящую повязку непосредственно на место повреждения.**
2. Наложить давящую повязку выше раны.
3. Наложить давящую повязку ниже раны.

Ответ: 1

---

48. **Каковы первоначальные действия при оказании первой помощи при травмах, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия?**

1. Промыть рану водой, удалить из неё инородные тела, наложить стерильную вату и закрепить бинтовой повязкой.
2. Надеть медицинские перчатки, обработать рану спиртовым раствором йода, нанести лекарственную мазь и закрыть лейкопластырем.
3. **Надеть медицинские перчатки, не очищая рану, закрыть её стерильной марлевой салфеткой, закрепив по краям лейкопластырем или бинтовой повязкой.**

Ответ: 3

---

49. **Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют шины и подручные средства для их изготовления?**

1. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль туловища, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности связывают между собой, проложив между ними мягкую ткань.
2. **Верхнюю конечность, согнутую в локтевом суставе и поддерживаемую косынкой, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности связывают между собой, проложив между ними мягкую ткань.**
3. Верхнюю конечность, согнутую в локтевом суставе и поддерживаемую косынкой, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности связывают между собой без мягкой прокладки.

Ответ: 2

---

50. **В каких случаях пострадавшего следует извлечь из салона автомобиля?**

1. При опрокидывании автомобиля, возгорании, высокой вероятности взрыва или потере пострадавшим сознания.
2. **При опрокидывании автомобиля, возгорании, высокой вероятности взрыва, переохлаждении пострадавшего, отсутствии сознания и дыхания, а также невозможности оказать первую помощь непосредственно в салоне.**
3. При опрокидывании автомобиля, возгорании, высокой вероятности взрыва либо наличии у пострадавшего сильного кровотечения или черепно-мозговой травмы.

Ответ: 2

---

51. **Что следует делать при оказании первой помощи при поверхностном термическом ожоге (покраснение и отёк кожи, образование пузырей с прозрачной жидкостью, сильная боль)?**

1. Полить обожжённую поверхность холодной водой, закрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать.
2. Вскрыть пузыри, очистить обожжённую поверхность от остатков одежды, закрыть стерильной салфеткой без бинтования, по возможности приложить холод и дать пострадавшему воду.
3. **Охлаждать обожжённую поверхность водой в течение 20 минут. Не вскрывая пузыри и не удаляя остатки одежды, закрыть ожог стерильной салфеткой без бинтования, по возможности приложить холод и дать пострадавшему воду.**

Ответ: 3
