ГРУППА 10

51 вопрос

Категории DT · теоретические вопросы

1. **При оказании помощи пострадавшему с травмой головы необходимо:**

1. Уложить его, приподняв ноги.
2. **Уложить его, приподняв голову и туловище, обеспечив полусидячее положение.**
3. Уложить его в горизонтальном положении.

Ответ: 2

---

2. **Кому из следующих пострадавших в дорожно-транспортном происшествии Вы окажете помощь в первую очередь?**

1. Испуганной беременной женщине.
2. Ребенку с ссадинами.
3. Мужчине с переломом плеча.
4. **Мужчине без сознания.**

Ответ: 4

---

3. **При оказании помощи пострадавшему при носовом кровотечении необходимо:**

1. Запрокинуть голову пострадавшего назад.
2. **Наклонить голову пострадавшего вперед и сжать верхнюю часть носа.**
3. Ввести в нос пострадавшего ватный тампон.
4. Дать крови свободно вытекать до самостоятельной остановки кровотечения.

Ответ: 2

---

4. **Во время управления автомобилем водитель внезапно начинает жаловаться на сильную давящую боль в груди и затрудненное дыхание. Что следует сделать?**

1. Предложить ему доехать до ближайшей больницы.
2. Дать стакан воды и 2 таблетки валерианы.
3. **Немедленно остановить автомобиль и включить аварийную световую сигнализацию.**
4. Посоветовать ему немного пройтись и подышать свежим воздухом.

Ответ: 3

---

5. **Какую помощь следует оказать пострадавшему при судорожном припадке?**

1. Удерживать пострадавшего, пытаясь сдерживать судороги.
2. Попытаться открыть рот, удерживать язык и поместить какой-либо предмет между зубами.
3. Попытаться открыть дыхательные пути, запрокинув голову пострадавшего назад.
4. **Не вмешиваться и дать судорогам закончиться.**

Ответ: 4

---

6. **Что следует сделать при оказании помощи при ожоге?**

1. Оставить ожог открытым.
2. Вскрыть наполненные жидкостью пузыри, затем туго забинтовать.
3. Нанести на ожог масло.
4. **Охладить ожог водой, затем закрыть стерильным перевязочным материалом или чистой тканью.**

Ответ: 4

---

7. **В результате ДТП пешеход упал и повредил руку. На предплечье имеется большая рана (около 5 см), из которой непрерывно течет темная кровь. Что следует сделать для остановки кровотечения?**

1. Промыть рану водой.
2. **Поднять руку пострадавшего и наложить давящую повязку.**
3. Обработать рану спиртовым раствором йода.

Ответ: 2

---

8. **При закрытых повреждениях мягких тканей конечностей в первые часы при оказании помощи необходимо:**

1. Наложить на поврежденное место согревающий компресс.
2. **Наложить холодный компресс на поврежденную область и приподнять ее.**
3. Наложить холодный компресс на поврежденную область и держать ее ниже уровня сердца.
4. Наложить на поврежденное место спиртовой компресс.

Ответ: 2

---

9. **Водитель долгое время менял колесо автомобиля, находясь на корточках. Резко встав, он схватился за голову и, внезапно потеряв сознание, упал. Что следует сделать?**

1. Попытаться усадить его.
2. **Поднять его ноги.**
3. Облить лицо холодной водой.
4. Похлопать по лицу.

Ответ: 2

---

10. **Что следует сделать, если невозможно обеспечить безопасность места происшествия?**

1. Оказывать помощь всем, соблюдая осторожность.
2. Оказать помощь пострадавшему, находящемуся ближе всего к вам.
3. **Не приближаться, немедленно вызвать экстренные службы и не допускать посторонних к месту происшествия.**
4. Не приближаться и попросить кого-либо другого оказать помощь.

Ответ: 3

---

11. **Вы видите лежащего человека и замечаете выступающую из голени кость и кровь. Если место происшествия безопасно, что следует сделать в первую очередь?**

1. Вызвать скорую помощь.
2. **Проверить сознание и дыхание.**
3. Обездвижить ногу.

Ответ: 2

---

12. **При открытом переломе конечности при оказании помощи необходимо:**

1. Немедленно поднять поврежденную конечность.
2. **Накрыть рану стерильной салфеткой и обездвижить поврежденную конечность.**
3. Остановить кровотечение прямым давлением.
4. Наложить на рану холодный компресс.

Ответ: 2

---

13. **При травме грудной клетки следует:**

1. Уложить пострадавшего в горизонтальном положении.
2. **Посадить, прислонив на травмированную сторону.**
3. Посадить, прислонив на здоровую сторону.

Ответ: 2

---

14. **При выпадении органов из открытой раны живота необходимо:**

1. Промыть и осторожно попытаться вправить выпавшие органы.
2. **Накрыть выпавшие органы чистой влажной тканью и полиэтиленовой пленкой.**
3. Отсечь выпавшие органы и перевязать рану.
4. Не трогать и в таком состоянии доставить пострадавшего в больницу.

Ответ: 2

---

15. **Пострадавшего, находящегося без сознания, но сохраняющего дыхание, следует:**

1. Уложить на спину.
2. Открыть рот и вытянуть язык.
3. **Повернуть на бок и запрокинуть голову.**

Ответ: 3

---

16. **При сильном кровотечении необходимо:**

1. Только закрыть рану повязкой.
2. **Наложить давящую повязку на поврежденную область и прижать артерию в точке прижатия.**
3. Засыпать рану золой.

Ответ: 2

---

17. **При дорожно-транспортном происшествии в первую очередь необходимо:**

1. Придать пострадавшему удобное положение.
2. **Осмотреть место происшествия и обеспечить безопасность.**
3. Проверить наличие у пострадавшего сильного кровотечения.
4. Извлечь пострадавшего из автомобиля.

Ответ: 2

---

18. **Если в ране пострадавшего находится инородное тело, при оказании помощи необходимо:**

1. Удалить инородное тело из раны.
2. Дать поврежденной области кровоточить.
3. **Обеспечить неподвижность инородного тела.**
4. Обработать область раны спиртом.

Ответ: 3

---

19. **Пульс взрослого человека в состоянии покоя составляет:**

1. 40–60 ударов в минуту.
2. **60–80 ударов в минуту.**
3. 80–100 ударов в минуту.

Ответ: 2

---

20. **Частота дыхания взрослого человека в состоянии покоя составляет:**

1. **12–18 дыхательных движений в минуту.**
2. 20–30 дыхательных движений в минуту.
3. 40–60 дыхательных движений в минуту.

Ответ: 1

---

21. **При ДТП пострадавшего следует извлечь из автомобиля, если:**

1. У пострадавшего имеются серьезные травмы.
2. **Место происшествия опасно, например существует угроза взрыва.**
3. На автомобиль упал электрический провод.

Ответ: 2

---

22. **При подозрении на внутреннее кровотечение в брюшной полости при оказании помощи необходимо:**

1. **Уложить пострадавшего и приложить холод к поврежденной области.**
2. Положить на живот теплую грелку.
3. Наложить на живот давящую повязку.
4. Дать пострадавшему большое количество жидкости.

Ответ: 1

---

23. **Вы слышите звук работающего двигателя автомобиля в гараже соседа и, открыв дверь, видите соседа, лежащего на полу. Что следует сделать в первую очередь?**

1. **Широко открыть двери и выключить двигатель, по возможности вынести пострадавшего из опасной зоны.**
2. Тщательно осмотреть тело пострадавшего для выявления повреждений.
3. Повернуть пострадавшего на бок в устойчивое безопасное положение.
4. Помочь пострадавшему принять полусидячее положение.

Ответ: 1

---

24. **После обнаружения пострадавшего без сознания в первую очередь необходимо:**

1. Дать ему холодной воды.
2. Повернуть его на бок, придав устойчивое безопасное положение.
3. Поддерживать нормальную температуру тела.
4. **Открыть дыхательные пути и проверить дыхание.**

Ответ: 4

---

25. **Для проверки кровообращения в конечности вы нажимаете на ноготь поврежденной конечности ниже повязки и отпускаете его. Кровообращение в конечности нарушено, если:**

1. Пострадавший ощущает боль.
2. Пострадавший ощущает дискомфорт.
3. При надавливании ноготь с трудом бледнеет.
4. **После отпускания ноготь медленно снова становится розовым.**

Ответ: 4

---

26. **Ваш друг, страдающий сахарным диабетом, почувствовал себя плохо и не помнит, когда в последний раз вводил инсулин. Что следует сделать в первую очередь?**

1. **Дать ему сахар или сладкую жидкость.**
2. Предложить ему отдохнуть несколько часов.
3. Посоветовать ввести инсулин.

Ответ: 1

---

27. **Кровотечение наиболее опасно, если:**

1. Кровь свертывается в течение 10 минут.
2. **Кровь бьет из раны струей.**
3. Кровь темно-красного цвета.
4. Кровь непрерывно вытекает из раны.

Ответ: 2

---

28. **Автомобиль столкнулся со столбом, и электрический провод упал на пострадавшего, находящегося без сознания рядом с автомобилем. При оказании помощи в первую очередь необходимо:**

1. Удалить пострадавшего от источника электрического тока.
2. Провести первичный осмотр.
3. **Удалить провод с пострадавшего с помощью какого-либо изолирующего предмета.**
4. Найти на теле места входа и выхода электрического тока (ожоги).

Ответ: 3

---

29. **Для защиты от заражения при оказании первой помощи необходимо:**

1. **Избегать непосредственного контакта с раной и оказывать помощь только в стерильных перчатках.**
2. Не оказывать помощь пострадавшим, у которых имеется кровотечение.

Ответ: 1

---

30. **При приступе бронхиальной астмы пострадавшему необходимо:**

1. **Помочь принять полусидячее положение.**
2. Уложить и приподнять ноги.
3. Уложить с согнутыми в коленях ногами.
4. Уложить, приподняв голову.

Ответ: 1

---

31. **Пострадавшего с травмой живота необходимо:**

1. Уложить, приподняв голову.
2. Уложить и приподнять ноги.
3. **Уложить с согнутыми в коленях ногами.**

Ответ: 3

---

32. **При обмороке пострадавшего необходимо:**

1. Помочь принять полусидячее положение.
2. **Уложить и приподнять ноги.**
3. Уложить с согнутыми в коленях ногами.
4. Уложить, приподняв голову.

Ответ: 2

---

33. **При столкновении автомобиля с низким кузовом со взрослым пешеходом ростом 1 м 55 см и выше наиболее вероятно возникновение у последнего травм:**

1. **В области нижних конечностей и головы.**
2. В области таза и грудной клетки.

Ответ: 1

---

34. **При столкновении автомобиля с низким кузовом с ребенком в возрасте 3–5 лет наиболее вероятно возникновение у последнего травм:**

1. В области нижних конечностей и головы.
2. **В области таза и грудной клетки.**

Ответ: 2

---

35. **Если электрический провод упал на автомобиль, необходимо:**

1. Помочь находящимся в автомобиле людям как можно быстрее выйти из него.
2. **Попросить находящихся в автомобиле людей оставаться внутри до отключения электрического тока.**

Ответ: 2

---

36. **При обработке менее опасных ран необходимо:**

1. **Промыть рану мылом и чистой водой, затем наложить повязку.**
2. Обработать рану спиртосодержащими средствами (йодом, водкой, одеколоном и т. п.).

Ответ: 1

---

37. **При обработке опасных ран необходимо:**

1. Промыть рану мылом и чистой водой.
2. Обработать рану спиртосодержащими средствами (йодом, водкой, одеколоном и т. п.).
3. **Остановить кровотечение и наложить повязку.**

Ответ: 3

---

38. **Какую информацию необходимо сообщить оператору при вызове скорой помощи в случае ДТП?**

1. Указать ближайший ориентир к месту ДТП. Сообщить количество пострадавших, их пол и возраст.
2. Указать ближайшие к месту ДТП улицу и номер дома. Сообщить, кто пострадал в результате ДТП (пешеход, водитель или пассажир автомобиля), и описать полученные травмы.
3. **Указать место ДТП (улицу, номер дома и ближайшие ориентиры). Сообщить количество пострадавших, их пол, примерный возраст, наличие сознания, дыхания, кровообращения, а также сильного кровотечения, переломов и других травм. Дождаться подтверждения оператора о принятии вызова.**

Ответ: 3

---

39. **Какое оптимальное положение следует обеспечить пострадавшему, не потерявшему сознание, при подозрении на повреждение позвоночника?**

1. Уложить пострадавшего на бок.
2. **Уложить пострадавшего на спину на твердую ровную поверхность, без необходимости не перемещать и не менять его положение.**
3. Уложить пострадавшего на спину, подложить под шею валик из одежды и поднять ноги.

Ответ: 2

---

40. **Как оказать первую помощь при обморожении и переохлаждении?**

1. Растереть пораженные участки тела снегом или шерстяной тканью, затем согреть, дать алкогольный напиток и перенести в теплое помещение.
2. **Согреть пораженные участки тела и обездвижить их, укрыть пострадавшего теплой одеждой или одеялом, дать теплое питье и перенести в теплое помещение.**
3. Смазать пораженные участки тела мазью, наложить согревающий компресс и грелку, перенести в теплое помещение и дать теплое питье.

Ответ: 2

---

41. **Какую первую помощь следует оказать при черепно-мозговой травме с раной волосистой части головы?**

1. **Остановить кровотечение прямым давлением на рану, наложить на нее давящую повязку. При потере сознания придать пострадавшему устойчивое боковое положение. По возможности приложить холод к области травмы головы.**
2. Иммобилизовать шейный отдел позвоночника с помощью самодельной шины (воротника). Наложить на рану стерильный ватный тампон, уложить пострадавшего на спину с приподнятыми ногами. По возможности приложить холод к голове.
3. Запрещается накладывать шейную шину. Необходимо закрыть рану медицинским лейкопластырем и уложить пострадавшего на бок.

Ответ: 1

---

42. **В каком положении следует уложить пострадавшего, потерявшего сознание, при наличии кровообращения и дыхания?**

1. На спину, подложив под голову валик.
2. На спину с разведенными ногами.
3. **Придать пострадавшему устойчивое боковое положение так, чтобы согнутое колено касалось земли, а верхняя рука находилась под щекой.**

Ответ: 3

---

43. **Как долго может оставаться наложенным кровоостанавливающий жгут?**

1. В теплое время — не более получаса, в холодное — не более одного часа.
2. **В теплое время — не более одного часа, в холодное — не более получаса.**
3. Время наложения жгута не ограничено.

Ответ: 2

---

44. **Как определить наличие дыхания у пострадавшего, находящегося без сознания?**

1. Взять пострадавшего за подбородок, запрокинуть голову и в течение 10 секунд наблюдать за движением грудной клетки.
2. **Положить одну руку на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой руки приподнять подбородок и запрокинуть голову; в течение 10 секунд оценивать дыхание, стараясь почувствовать выдыхаемый воздух щекой и наблюдая за движением грудной клетки.**
3. Не запрокидывая голову пострадавшего, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд оценивать дыхание, стараясь почувствовать выдыхаемый воздух щекой и наблюдая за движением грудной клетки.

Ответ: 2

---

45. **Каковы основные признаки сильного артериального кровотечения и с какого действия следует начать оказание первой помощи в такой ситуации?**

1. Из раны медленно вытекает кровь темного цвета. На рану накладывают давящую повязку с указанием времени ее наложения.
2. **Из раны сильными толчками, прерывистой струей или фонтаном вытекает ярко-красная кровь. Поврежденную артерию необходимо прижать пальцами, затем выше раны, как можно ближе к ней, наложить кровоостанавливающий жгут с указанием времени его наложения.**
3. Кровь медленно вытекает из раны. Ниже места повреждения накладывают кровоостанавливающий жгут с указанием времени его наложения.

Ответ: 2

---

46. **Разрешается ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании первой помощи?**

1. Разрешается.
2. Разрешается в случае крайней необходимости.
3. **Запрещается.**

Ответ: 3

---

47. **Как остановить кровотечение при повреждении вен и некрупных артерий?**

1. **Наложить давящую повязку непосредственно на место повреждения.**
2. Наложить давящую повязку выше раны.
3. Наложить давящую повязку ниже раны.

Ответ: 1

---

48. **Каковы первоначальные действия при оказании первой помощи при травмах, полученных в результате ДТП?**

1. Промыть рану водой, удалить из нее инородные тела, наложить на рану стерильную вату и закрепить бинтовой повязкой.
2. Надеть медицинские перчатки, обработать рану спиртовым раствором йода, нанести лекарственную мазь и закрыть лейкопластырем.
3. **Надеть медицинские перчатки, не очищая рану, закрыть ее стерильной марлевой салфеткой, закрепив по краям лейкопластырем или бинтовой повязкой.**

Ответ: 3

---

49. **Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют шины и подручные средства для их изготовления?**

1. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль туловища, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности связывают между собой, проложив между ними мягкую ткань.
2. **Верхнюю конечность, согнутую в локтевом суставе и поддерживаемую косынкой, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности связывают между собой, проложив между ними мягкую ткань.**
3. Верхнюю конечность, согнутую в локтевом суставе и поддерживаемую косынкой, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности связывают между собой.

Ответ: 2

---

50. **В каких случаях пострадавшего следует извлечь из салона автомобиля?**

1. При опрокидывании автомобиля, возгорании, высокой вероятности взрыва или потере пострадавшим сознания.
2. **При опрокидывании автомобиля, возгорании, высокой вероятности взрыва, переохлаждении пострадавшего, потере сознания и дыхания, а также при невозможности оказать первую помощь непосредственно в салоне.**
3. При опрокидывании автомобиля, возгорании, высокой вероятности взрыва либо при наличии у пострадавшего сильного кровотечения или черепно-мозговой травмы.

Ответ: 2

---

51. **Что необходимо сделать при оказании первой помощи при поверхностном термическом ожоге (покраснение кожи, отек, появление пузырей с прозрачной жидкостью в области ожога, сильная боль)?**

1. Полить обожженную поверхность холодной водой, закрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать.
2. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, закрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и дать пострадавшему воды.
3. **Охлаждать ожоговую поверхность водой в течение 20 минут. Не вскрывая пузыри и не удаляя остатки одежды, закрыть ожоговую поверхность стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и дать пострадавшему воды.**

Ответ: 3
